

醫

燈

續

焰

醫燈續焰卷二

錢塘後學潘 楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人 汪之琦奇玉 校

支希璋玉森

浮脉主病第十六

浮脉主表裏必不足有力風熱無力血弱浮遲風虛  
浮數風熱浮緊風寒浮緩風濕浮虛傷暑浮芤失血  
浮而沉以諸

浮脉主表裏必不足有力風熱無力血弱浮遲風虛  
浮數風熱浮緊風寒浮緩風濕浮虛傷暑浮芤失血

經脈之要後  
及迷數  
依此

經脈之要後  
及迷數  
依此

浮洪虛火。浮微勞極。浮濡陰虛。浮散虛極。浮弦痰飲。  
浮滑痰熱。

皮毛曰表。言在外也。浮脉與皮毛相得。亦有勢汎  
汎外浮者。皆主表。氣應於表。其裏必虛。故裏不足。  
浮亦主風。浮而有力。風熱所爲。蓋風爲陽邪。其性  
輕浮動蕩。加之以熱。勢必壅盛。故有力也。宜荆防  
羌活。秦  
梔石羔無力。則浮而虛矣。血主裏。氣主表。血弱不  
能諧氣。故反浮。亦裏不足之義。宜參耆四  
物湯之類。脉浮而

切甚

至數遲

為寒勢緩

心體會

遲。乃鼓動之不及也。為風虛。宜四君子湯。或桂參耆之類。脉浮

而數。乃鼓動之太過也。為風熱。宜荊防膏薄。梔苓丹皮生地之類。

脉浮而緊。緊則緊飲。寒之性也。風中有寒。宜九味羌活湯。

麻黃湯。或蘇葛羌杏姜葱之類。脉浮而緩。緩則緩漫。濕之性也。風

中有濕。宜羌防蒼白朮。防已黃耆桂附之類。浮虛傷暑者。暑傷乎氣。

氣主浮外。而暑性張散。故傷暑者多汗。經曰。脉虛

身熱。得之傷暑者是也。宜清暑益氣湯。十味香薷飲之類。浮乳失

血者。血去脉空耳。蓋衛行脉外。榮行脉中。血失則

榮損。榮損。則脉中空如芤草之狀也。宜參耆歸芍。或當歸補血。

湯。髮玉。膏之類。脉浮而洪。充湧指下。火之象也。但浮則有

表無裏。故曰虛火。宜當歸補血湯。四物湯。六味丸。八味丸之類。浮微勞

極。陽氣欲絕也。素問生氣通天論曰。陽氣者。煩勞

則張精絕。辟積於夏。使人煎厥。目盲不可以視。耳

閉不可以聽。潰潰乎若壞都。汨汨乎不可止。蓋言

陽氣清淨。煩勞。則陽精張散而竭絕。積于夏長之

時。當振發而反退陷。故變病如上。是名煎厥。煎厥

者。氣應振而反糜。應出而反入。如煎迫之自外及裏。煎熬之由多漸少。卽難經十四難所謂。自皮毛以及于骨之五損。從上下者是也。今之五勞六極。虛怯損瘵。皆煎厥之類。陽主浮。以其因于耗陽。故脉浮微耳。宜十全大補湯。生脉散。大造丸。四君子湯。八珍湯之類。脉浮而濡。衰薄之甚。僅有其上。若無其下。故主陰虛。宜四物湯。六味丸之類。若浮而散。則又陰虛之極矣。陽在外。陰之使。陰在內。陽之守。陰虛極而不能爲守。則陽無所依。

浮越而散。略無陰凝內歛之象。故陰虛劇。然而孤

精於內。氣耗於外。謂之陰陽兩虛亦可。

宜十全大補湯。金匱

腎氣丸之類。

脈浮弦者。痰飲。痰飲何自而生乎。素問經

脈別論曰。飲食入胃。遊溢精氣。上輸于脾。脾氣散

精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經

並行。又榮衛生會篇曰。上焦如霧。中焦如漚。下焦

如瀆。二說雖殊。其理則一。方飲之。由胃遊溢而上。

輸于脾也。腐熟如酒醪之噴發。炊釜之沸騰。即中

三焦布播  
而運入  
榮衛通  
用  
三焦

五帝之力  
 任則為依  
 則為其隨  
 經而見症  
 經之為  
 治諸屬反  
 其其亦  
 其其所謂  
 其能達  
 其如可  
 其不了  
 其難下手

焦○之○如○漚○由○脾○散○精○而○上○歸○于○肺○也○拔○粹○升○純○氣○  
 氤○若○喫○即○上○焦○之○如○霧○由○肺○之○通○調○而○下○輸○膀○胱○  
 也○氣○化○開○通○溲○便○注○泄○即○下○焦○之○如○瀆○名○雖○有○三○  
 實○則○一○氣○若○氣○虛○寒○不○運○則○飲○亦○停○留○不○行○隨○不○  
 運○之○處○停○留○則○隨○停○留○之○處○是○病○矣○大○約○暴○則○為○  
 飲○久○則○成○痰○清○薄○則○為○飲○濁○厚○則○成○痰○寒○多○則○為○  
 飲○熱○多○則○成○痰○熬○汁○收○膏○煮○水○結○鹽○之○義○也○弦○乃○  
 陰○脉○為○陽○不○足○仲○景○云○弦○為○陽○運○正○言○陽○之○不○能○



運也。又云。沉潛水蓄。支飲急弦。俱言陽氣衰弱。不

能運行其飲。故見此弦。歛不鼓之脉耳。

宜金匱苓桂木甘湯。

小青龍湯之類。

水飲應沉而言浮者。當在上焦。若浮而滑。

則非弦。歛不鼓之脉。寒當化熱。飲當成痰。此必然

之理也。

宜二陳湯。或梔芩花粉玄明粉之類。

### 附方

參耆四物湯

治血虛。氣不能與之諧。反上氣喘

促。自汗惡寒。面白脉浮。按之空澁。或曾經失血

者。

人參  
一錢

黃耆 二錢 蜜炙

當歸 二錢

熟地黃 二錢

白芍藥 酒炒 一錢半 芩薊 入分

右爲粗末水二盞煎七分溫服

四君子湯 治真氣虛弱及短氣脉弱加陳皮名

異功散加陳皮半夏名六君子湯。

白朮  
人參  
茯苓

甘草 各等分

雜曰白水強  
出使連夜苓  
暖溫牌其  
軍守氣于中  
客入參益氣  
于其氣皆三  
彈胃者以人  
第真氣即水

穀之氣也四  
藥冲和平滯  
而能補氣維  
陽誠君子哉

舊曰雖是欄  
江欄然亦平  
正可用

右爲粗末。每服五錢。水一盞。煎至七分。食遠溫服。

九味羌活湯

羌活

防風

蒼朮

各一錢二分半

甘草

白芷

川芎

生地黃

黃芩

各一錢

細辛

四分

加生薑三片。大棗一枚。水二盞。煎八分。熱服取汗。陶節菴云。春夏秋感冒。頭疼發熱。惡寒無汗。

脉浮緊。見太陽表證。宜服此。平正方也。其加減法。在人自變通耳。

仲景麻黃湯 治傷寒太陽脉浮。頭項強痛。腰脊疼。發熱惡寒。身體痛。無汗而喘者。

麻黃

一兩半

桂枝

一兩

甘草

五錢

杏仁

去皮尖  
五十粒

爲粗末。每服五錢。水二盞。煎初沸。去上沫。再煎至七分。溫服。取汗。汗出不必服盡劑。

清暑益氣湯

黃耆

一錢半 汗少減五分

蒼朮

一錢半

升麻

一錢

人參

去蘆

白朮

陳皮

神麴

澤瀉

各五分

甘草

炙

黃蘗

酒浸

葛根

青皮

去瓢

當歸身

麥門冬

去心各三分

五味子

九粒

水二大盞煎至一盞去滓食遠稍熱服劑之多

少臨時斟酌

此東垣所製以治長夏土令濕

勝非獨暑也其論云暑濕蒸熾人感之則四肢困倦精神短少胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩小便黃數大便澇頻或痢如黃糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗或汗少血先病而氣不病也其脉洪緩若血氣相搏必更加遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃耆

甘溫補之爲君人參橘皮當歸甘草甘微溫補  
中益氣爲臣蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻  
葛根甘苦平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則  
食不消而作痞滿故炒麴甘辛青皮辛溫消食  
快氣腎惡燥惡食辛以潤之故以黃蘗苦辛寒  
偕甘味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味  
子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷於庚金爲佐  
名曰清暑益氣湯

百一十味香薷飲 消暑氣和脾胃

香薷 一兩

人參 去蘆

陳皮 湯泡去白

白朮

白茯苓

白扁豆 炒去殼

黃耆 去蘆

乾木瓜

厚朴 薑汁製炒

炙甘草 各半兩

右爲細末。每服二錢。不拘時。熱湯或冷水調下。

當歸補血湯 治氣血俱虛。肌熱惡寒。面目赤色。

煩渴引飲。脉洪大而虛。重按似無。此脉虛血虛。



也。此病多有得于饑飽勞役者。

黃耆

一兩炙

當歸

二錢酒洗

右咬咀作一服。水三盞。煎至一盞。去滓溫服。食前。

瓊玉膏 治吐血欬嗽。

生地

新鮮者取汁四片

白茯苓

十三兩

人參

六兩

以參苓爲極細末。以地黃汁和蜜拌入。用瓶貯。紙箬包其口。用桑柴火重湯煮三晝夜。取出水。

白熟地質  
 色黑而  
 湯揚  
 上茯苓  
 參午下行  
 用丹皮湯  
 而水不  
 桑葉蔞精  
 而水自固  
 山藥者又  
 以防制  
 化生也  
 白比熟  
 化生內

浸三日。白湯點服。

六味丸 一名地黃丸。治腎經不足。發熱作渴。小

便淋閉。氣壅痰嗽。頭目眩暈。眼花耳聾。咽燥舌

痛。齒牙不固。腰腿委軟。自汗盜汗。便血。諸血失

音。水泛為痰。血虛發熱等證。其功不能盡述。

熟地黃

八兩酒蒸并膏

山茱萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

去骨

白茯苓

去皮

澤瀉

去毛各三兩

右各另為末。和地黃膏加煉蜜。丸桐子大。每服

地宜九蒸  
 多蒸不  
 身氣溫  
 水陽生之  
 人以水  
 絕不見  
 此與煎刺  
 生地何異  
 氣血不  
 兩補之  
 方以四君  
 補氣以四  
 補血益氣  
 者水較之  
 微也遊滋  
 行欲搜脾

七八十丸。空心滾湯下。

八味丸 治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛弱。

飲食少思。大便不實。臍腹疼痛。夜多漩溺等證。

即六味丸加。肉桂附子 各一兩。

十全大補湯 治氣血俱虛。發熱惡寒。自汗盜汗。

肢體倦怠。或頭痛眩暈。口乾作渴。喉痛舌裂。及

久病虛損。口乾食少。欬而下利。驚悸發熱。或寒

熱往來。晡熱內熱。遺精白濁。二便見血。小腹作

腎。腰。骨。酸。痛。或。大。便。乾。澀。或。大。便。滑。泄。肛。門。下。墜。  
 或。腹。門。火。衰。則。精。亦。薄。氣。血。亦。何。自。而。生。  
 乎。所。以。加。肉。桂。者。釜。底。添。薪。耳。釜。底。添。薪。而。釜。無。水。則。上。中。下。三。焦。皆。如。涸。者。  
 腎。虛。散。下。無。實。際。况。又。有。自。汗。盜。汗。外。泄。之。證。耶。

痛。小。便。短。少。大。便。乾。澀。或。大。便。滑。泄。肛。門。下。墜。  
 小。便。頻。數。陰。莖。痒。痛。或。臍。腹。陰。冷。便。溺。遺。澀。或。  
 心。神。不。寧。寤。而。不。寐。或。形。容。不。充。肢。體。作。痛。或。  
 鼻。吸。氣。冷。急。趨。氣。促。等。證。皆。是。無。根。虛。火。但。服。  
 此。藥。諸。病。悉。除。凡。元。氣。素。弱。起。居。失。宜。飲。食。勞。  
 倦。用。心。太。甚。以。此。為。主。

肉桂  
 甘草  
 芍藥

黃耆  
 當歸  
 川芎

此黃耆後益  
藥上之品斷  
斷不可少者  
也。

生白。此方  
在五味子  
以五味子入  
煎。氣。今無  
傷。而成脉

人參

白朮

茯苓

熟地黃

各等分

右水煎服

生脉散 治熱傷元氣。肢體倦怠。氣短懶言。口乾

作渴。汗出不止。或濕熱大行。金為火制。絕寒水

生化之源。致肢體痿軟。脚軟眼黑。最宜服之。

人參

五錢

五味子

麥門冬

各三錢

右水煎服

治腎。以人  
 人。自有奇  
 洗根氣所  
 必達不曉  
 米以湯蒸。庶  
 其性。今人  
 者。火焙者  
 非理也。

大造丸 治諸虛百損。精血兩虧。形體尪羸。筋骨

痿弱。或七情傷感。以致成勞。或外感失調。久成

虛乏。凡一切不足之疾。服此漸復真元。功難盡

述。

紫河車

一具。用米泔水浸。輕輕攤開。換洗令淨。白為度。勿動筋膜。用竹器盛于長流水

中浸一刻。取生氣。提回。以瓦瓶隔湯煮極爛。如糊。取出。先傾汁入藥內。用石臼木椎搗極

均細為度。入後藥。

乾地黄

一兩

熟地黄

二兩

麥門冬

去心

天門冬

去心各

當歸

一兩

枸杞子 七錢 五味子 牛膝 各七錢

杜仲 一兩半 小茴香 黃藥

白朮 各二兩 陳皮 二錢 乾薑 二錢

側柏葉 採向東嫩枝 隔紙焙二兩

如氣虛。加入參黃耆各一兩。血虛。倍當歸地黃。

腎虛。加覆盆子。巴戟。去心。山茱萸肉。各一兩。腰

痛。加白朮。鹽水。草薢。瑁陽。蘇續斷。酒洗。各一兩。骨

蒸。加地骨皮。知母。丹皮。各一兩。如煩人。去黃藥。

加川芎。香附。條芩。

俱酒洗

一兩共末。同河車爲丸。

如桐子大。每服三錢。清晨白湯下。

八珍湯

治肝脾傷損。氣血虛弱。惡寒發熱。煩躁

作渴。或不時寒熱。眩暈昏憤。或大便不實。小便  
淋赤。或飲食少思。小腹脹痛等證。

人參

白朮

白茯苓

各三錢

甘草

炙

芍藥

各一錢

當歸

熟地黃

各三錢

川芎

一錢五分



右水煎服。

仲景苓桂朮甘草湯 傷寒論云。治傷寒吐下後。心

下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脉沉緊。發汗則動

經。身爲振振搖者。服此湯。又治停痰寒飲。中虛

冷瀉等證。

茯苓

四兩

桂枝

三兩  
去皮

白朮

甘草

各二兩  
炙

右水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。

俗賢曰。此治  
 水寒射肺而  
 致者。  
 按曰。龍以行  
 未。能潛行于  
 肺。故曰小。  
 不似大龍之  
 出汗作霖雨  
 也。

仲景小青龍湯 傷寒論云。傷寒表不解。心下有

水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不

利。少腹滿。或喘者。服此湯。又治停飲。久欬肺寒。

麻黃 去節

芍藥

細辛

乾薑

甘草 炙

桂枝

去皮各三兩

五味子

半升

半夏

半升洗

右以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥

煮取三升。去滓溫服一升。若渴。去半夏。加栝蒌

補白。痰由飲  
 滯脾胃之運  
 布之力也。耳  
 草助脾胃治  
 本。陳皮宜穀  
 氣於上。茯苓  
 水飲于下。  
 土夏得樞機

根三兩。若微利。去麻黃。加薤花如雞子大。熬令  
 赤色。若噎者。去麻黃。加附子一枚。炮。若小便不  
 利。少腹滿者。去麻黃。加茯苓四兩。若喘者。去麻  
 黃。加杏仁半升。去皮尖。

二陳湯 治脾胃虛弱。中脘停痰。或嘔吐惡心。或  
 頭目不清。飲食少思等證。乃諸痰主藥。

陳皮 一錢五分 半夏 二錢五分 白茯苓 去皮二錢

甘草 八分

于中痰飲欲  
行而諸證自  
除矣

加薑一錢煎服。

沉脉主病第十七

沉脉主裏。主寒主積。有力痰食。無力氣鬱。沉遲虛寒。  
沉數熱伏。沉緊冷痛。沉緩水蓄。沉牢痼冷。沉實熱極。  
沉弱陰虛。沉細痺濕。沉弦飲痛。沉滑宿食。沉伏吐利。  
陰毒聚積。

脉按之至骨曰沉。對待浮表。是曰主裏。寒乃水寒。  
積乃藏積。總屬陰凝。故見沉脉。沉而有力。有物在

裏非痰卽食

痰宜用王隱君滾痰丸。食宜用仲景大承氣湯之類。沉而無力。

裏原非實。但氣不伸。

宜和劑四士湯。河間正氣天香散之類。

沉爲在

裏而復遲。虛寒可必。

宜仲景理中湯。或附子理中湯之類。

沉爲在裏

而加數。伏熱何疑。

宜寶鑑既濟解毒湯。導赤散。黃連解毒湯之類。

沉而緊。

則寒爲歛實。故冷痛也。

宜金匱烏頭煎。和劑來復丹之類。

沉而緩。

則陽不健行。故水腫焉。

宜仲景五苓散。苓桂朮甘湯之類。

沉而生

乃陰寒之滯著。應當痼冷。

宜和劑來復丹。大七香丸。沉而實。是

陽氣之聚。宜子難深。

宜仲景大承氣湯。子和解芩芩丸之類。沉爲陰

弱爲虛。沉弱必主陰虛。

宜金匱腎氣丸。六味丸之類。

沉爲裏。細

爲濕。沉細定成痺濕。

宜金匱桂枝附子湯和劑。滲濕湯。或胃苓湯之類。

沉

爲陰。弦爲飲。沉弦則飲停腹陰而時痛。

宜仲景小青龍湯。

苓散之類。

沉爲裏。滑爲食。沉滑則食宿腸裏而難推。

宜

景大承氣湯。潔古枳朮丸。丹溪保和丸之類。

沉已氣沉于骨。伏則至骨。

如無勢甚篤危。須分久暴。暴則既吐且利而暴脫。

溫補可回。

宜和劑大七香丸。仲景理中湯。或藿香正氣散之類。

久則陰毒聚。

積之久阻。峻攻莫愈。

宜枳實理中丸之類。

附方

王隱君滾痰丸

養生主論

痰之爲病。成偏頭風。成雷頭

風。成太陽頭痛。眩暈如坐舟車。精神恍惚。或口

眼瞶動。或眉稜耳輪俱痒。或頷腮四肢遊風腫

硬。似疼非疼。或渾身燥痒。搔之則癢疹隨生。皮

毛烘熱。色如錦斑。或齒頰似痒似痛而疼無定

所。滿口牙浮。痛痒不一。或噁氣吞酸。鼻聞焦臭。

喉間豆腥氣。心煩鼻塞。咽嗑不利。咯之不出。

之不下。或因噴嚏而出。或因舉動而唾。其痰如  
墨。又如破絮。或如桃膠。或如蜆肉。或心下如停  
冰鐵。閉滯妨悶。噁噁連聲。狀如膈氣。或寢夢刑  
戮。刀兵劍戟。或夢入人家。四壁圍繞。暫得一寶。  
百計得出。則不知何所。或夢在燒人地上。四面  
烟火枯骨。焦氣撲鼻。無路可出。或不因觸發。忿  
怒悲啼。雨淚而寤。或時郊行。忽見天邊兩月交  
輝。或見金光數道。回頭無有。或足膝酸軟。或骨



節腰腎疼痛。呼吸難任。或四肢肌骨間痛如擊。  
發乍起乍止。並無常所。或不時手臂麻疼。狀如  
風濕。或卧如芒刺不安。或如毛虫所螫。或四肢  
不舉。或手足重滯。或眼如薑蜚。膠粘痒澀。開闔  
甚難。或陰睛交變之時。胸痞氣結。閉而不發。則  
齒痒咽痛。口糜舌爛。及其奮然而發。則噴嚏連  
聲。初則涕唾稠粘。次則清水如注。至眼前黑暗。  
腦後風聲。耳內蟬鳴。眼肉惕治之者。或曰膝

理不密。風府受邪。或曰上盛下虛。或曰虛。或曰寒。或曰熱邪。唯洞虛子備此疾苦。乃能治療。病勢之來。則胸腹間。如有二氣交紐。噎塞煩鬱。有如火上衝。頭面烘熱。眼花耳鳴。痰涎涕淚。並從肺胃間涌起。凜然毛豎。噴嚏千百。然後遍身煩躁。則去衣凍體。稍止片時。或春秋乍涼之時。多加衣衾。亦得暫緩。或頓飲冰水而定。或痛飲一醉而寧。終不能逐去病根。乃得神秘沉香丸。

方。屢獲大効。愈人數萬。但不欲輕傳匪人。故以  
隱語括之。詩曰。甌裏翻身甲帶金。於今頭戴草  
堂深。相逢二八求斤正。硝煨青礞倍若沉。十七  
兩中零半兩。水丸梧子意須斟。除驅怪病安心  
志。水瀉雙身却不任。

大黃

蒸少頃。翻過再蒸少頃。即取出。不可過。

黃芩

各八兩

青礞石

硝煨如金色 沉香

百藥煎

此用百藥煎

得之方外秘傳。蓋此丸得此藥。乃能收斂。身頑挺。聚于一處。然後利下。甚有奇功。曰倍。

若沉者。言五倍子與沉香。非礞  
倍于沉之謂也。以上各五錢。

右爲末。水丸如梧子大。白湯食後空心服。

一切新舊失心喪志。或癲或狂等證。每服一百  
丸。氣盛能食狂甚者。加二十丸。臨時加減消息  
之。一切中風癱瘓。痰涎壅塞。大便或通或結  
者。每服八九十丸。或加至百丸。永無秘結之患。  
一切陽證風毒脚氣。遍身遊走疼痛。每服八九  
十丸。未効。加至百丸。一切無病之人。遍身筋

骨疼痛。不能名者。或頭痛牙疼。或搖或痒。風眩  
等證。風寒鼻塞。身體或疼或不疼。非傷寒證者。  
服八九十丸。痰盛氣實者加之。一切吞酸噯  
逆。膈氣及胸中疼悶。腹中氣塊衝上。嘔沫吐涎。  
狀如反胃。心下恍惚。如畏人捕。怵惕不安。陰陽  
關格。變生乖證。食饑傷飽。憂思過慮。心下噎噤。  
或痛或噦。或晝夜虛飽。或饑不喜食。噤慢喉閉。  
赤眼。每用加減服。一切新舊痰氣喘嗽。或嘔。

吐。頭運目眩。加減服之。一切顙頰腫硬若瘰癧者。及口糜舌爛。咽喉生瘡者。每服六七十丸。加蜜少許。一處嚼碎嚥化。睡時徐徐嚥之。曾有口瘡者。服二三十丸。依前法嚥之。三二夜卽瘥。○一切男婦大小。虛實心疼連腹。身體羸瘦。發時必嘔綠水黑汁冷涎。乃至氣絕。心下溫煖者。量虛實加減服之。若事屬不虞之際。至於百丸。卽便回生。未至顛危者。虛弱疑似之間。只服三

愈音牽  
通也

醫白債膏

十九。或五十九。立見生意。然後續續進之以瘥  
爲度。兼服生津化痰。溫中理氣之藥。○一切在  
苒疾病。凡男婦患非傷寒。內外等證。或酒色過  
度。或吐血。或月事愆期。心煩志亂。或腹脹脇痛。  
勞倦痰眩。或暴行日中。因暑伏痰。口眼喎邪。目  
痛。耳聾。鼻塞。骨節酸疼。乾嘔惡心。諸般內外疼  
痛。百藥無効。衆醫不識者。依前法加減服之効。  
大抵服藥。須臨卧在牀。用熟水一口許。嚥下便。

卧。令藥在喉膈間。徐徐而下。如日間病出不測。疼痛不可忍。必欲急除者。須是一依前卧法服大半日。不可服湯水。及不可起身行坐言語。正候藥丸除逐下焦痰滯惡物。過膈入腹。然後動作。方能中病。每夜須連進二次。次日痰物既下三五次者。仍服前數。下五七次。或直下二三次。而病勢頓已者。次夜減二十丸。頭夜所服。並不惡物者。次夜加十丸。人壯病實者。多加至百



九。惟候虛實消息之。或服過仰睡。咽喉稠粘。壅塞不利者。痰氣泛上。乃藥病相攻之故也。少頃藥力既勝。自然寧帖。往往病久結實于肺胃之間。或則暴病全無泛濫者。服藥下咽。卽仰卧。頓然百骸安靜。五藏清寧。次早先去大便一次。其餘遍數。皆是痰涕惡物。看甚麼糞。用水攪之。盡是痰片粘涎。或稍稍腹痛。腰腎拘急者。蓋有一種頑痰惡物。閉氣滯腸。裏急後重者。狀如痢疾。

片餉卽已。若有痰涎易下者。快利不可勝言。頓  
然滿口生津。百骸爽快。間有片時倦怠者。蓋因  
連日病苦不安。一時爲藥力所勝。氣體暫和。如  
醉得醒。如浴方出。如睡方起。此藥並不洞泄利  
腸大瀉。但取痰積惡物。自腸胃次第而下。腹中  
糟粕。並不相傷。其推下腸腹之糞。則藥力所到  
之處。是故先去其糞。其餘詳悉不能盡述。服者  
當自知之。

禮曰。地道閉。塞不能順承。平天下之所。以承之也。證。有重。故湯。有。小大。

仲景大承氣湯 此仲景以之下邪熱入裏成痞

滿燥實堅者。後人用下腹中一應有餘積聚食

物皆効。但寒飲冷積不宜。

大黃

日雨酒洗

厚朴

半斤炙去皮

枳實

五枚炙

芒硝

三合

右以水一斗。先煮二物取五升。去滓。內大黃煮

取二升。去滓。內芒硝。更上微火一兩沸。分溫再

服。得下。餘勿服。

仲景小承氣湯 功力稍次于大承氣不甚堅韌

燥結者宜之。

大黃

四兩

厚朴

二兩

枳實

三枚

右三味以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二

服。初服湯。當更衣。不爾者。盡飲之。若更衣。勿再

服。

大七氣湯

即和劑  
四七湯

治喜怒不節。憂思兼并。多生

悲恐。致藏氣不平。心腹脹滿。

半夏

茯苓

各四兩

厚朴

炒三錢

紫蘇

二錢

右劉入薑煎服

河間正氣天香散 治九氣

烏藥

二兩

香附末

八兩

陳皮

蘇葉

乾薑

各一兩

右為細末每服一錢匕鹽湯下

仲景理中圓

加附子二錢炒。即名附子理中圓。今人用為湯更捷。

理中湯

治傷寒霍亂。下利清穀。感冒吐瀉。一切脾胃虛寒。中冷不食等證。

乾薑

炮

白朮

炒

甘草

炙

人參

各二錢半

水二鍾。煎八分。食前溫服。

寶鑑既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛。胸膈

煩悶。不得安卧。身半以下皆寒。足脗尤甚。大便

微秘。

大黃

酒煨大便  
利勿用

黃連

酒炒

黃芩

酒炒

甘草

炙

桔梗

各二錢

柴胡

升麻

連翹

當歸身

各一錢

右咬咀作一服。水二鍾。煎至一鍾。去滓。食後溫

服。忌醇酒濕麵及生冷硬物。

錢氏導赤散 治小腸伏熱。小便赤澀。或痛。或手

心熱。或心煩動悸。白濁等證。

生地黃

木通

甘草

各等分

右同爲末。每服三錢水一盞。入竹葉七片。同煎至五分。食後溫服。一本用黃芩不用甘草。

仲景黃連解毒湯 治下焦一切伏熱實熱。或小

便赤色而痛。大便熱結。腹中熱。或大小便見血。

黃連

七錢半

黃蘗

梔子

各半兩

黃芩

一兩

每服五錢水一盞半。煎至一盞。去滓熱服。未知

再服。



金匱烏頭煎 治寒疝繞臍疝痛欲死及沉寒痼  
冷一切溫煖藥不能取効者宜此主之。

烏頭

大者五枚熬  
去皮不改阻

右以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎令水  
氣盡。取二升。強人服七合。弱人服五合。不差。明  
日更服。不可日再服。

和劑來復丹 治上盛下虛。裏寒外熱。伏暑泄瀉  
嘔吐。心腹疼痛等證。

硝石

一兩。同硝黃為末。入薤白以飯火炒。柳篋攪。不可火太過。恐傷藥力。再研極細。

名二氣末

太陰玄精石

研。舶上硫黃。透明者。各

一兩

五靈脂

水澄去砂。晒乾。

青皮

去白

陳皮

去白。各二錢

右用五靈脂二橘皮為末。次入玄精石末。及前

二氣末拌勻。好醋打糊為丸。豌豆大。每服三十

丸。空心米飲下。印作錠子。磨服更佳。

仲景五苓散 傷寒論云。太陽病。發汗後。大汗出。

胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之  
令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者  
五苓散主之此蓋治汗後表不盡解渴多飲水  
水液復停服此解未盡之表一以行停中之水  
今人用爲行飲利小便之常藥亦多効驗。

猪苓

十八銖  
去皮

澤瀉

一兩  
六銖

白朮

十八  
錢

茯苓

十八銖  
去皮

桂枝

半兩  
去皮

右五味擣爲末以白飲和服方寸匕日三服多

飲煖水汗出愈。

和劑大七香丸 治脾胃虛冷。心膈噎塞。漸成膈

氣。脾泄瀉利。反胃嘔吐。

香附子

二兩

麥蘖

一兩

丁香皮

三兩半

縮砂仁

藿香

官桂

甘草

陳皮

各二兩半

甘松

烏藥

各六錢半

右十味爲末。蜜丸彈子大。每服一九。鹽酒鹽湯

任嚙下。忌生冷肥膩物。

和劑小七香丸 溫中快膈。化積和氣。治中酒嘔。

逆氣膈食噎茶酒食積。小兒疳氣。

甘松

八兩

益智仁

六兩

香附子

炒

丁香皮

甘草

炙各十兩

蓬朮

煨

縮砂

各二兩

右爲末。蒸餅爲丸。每服二十九。溫酒下。

湯熱水任下。

神芩導水丸

黃芩

一兩

黃連

川芎

薄荷

各半兩

大黃

二兩

滑石

黑牽牛

頭末各四兩

河間製。治一切熱證。其功不可盡述。設或久病

熱鬱。無間瘦痿老弱。并一切證可下者。始自十

九。以爲度。常服此藥。除腸胃積滯。不傷和氣。推

陳致新。得利便快。並無藥燥搔擾。亦不困倦虛

損。遂病人心意。或熱甚。必急須下者。使服四五  
十丸。未効再服。以意消息。常服二三十丸。不動  
藏府有益無損。或婦人血病下惡物。加桂半兩。  
病微者常服。甚者取利。因而結滯。開通惡物自  
下也。凡老弱虛人。脾胃經虛。風熱所鬱。色黑齒  
稿。身瘦萎黃。或服甘熱過度。成三消等病。若熱  
甚於外。則肢體躁擾。病于內。則神志躁動。怫鬱  
不開。變生諸證。皆令服之。惟藏府滑泄者。或裏

寒脉遲者。或婦人經病產後。血下不止。及孕婦等。不宜服。

金匱腎氣丸

見第十六

六味丸

見第十六

金匱桂枝附子湯

傷寒論云。太陽病發汗。遂漏

不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。此湯主之。蓋亡陽脫液。故見上證。是湯和榮衛以復陽。若風寒濕痺等證。用之亦妙。



桂枝

三兩  
去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩  
炙

生薑

三兩  
切

大棗

十二枚

附子

三枚

右咬咀以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已。須臾啜熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。半身發熱微似有汗者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。後服不必盡劑。若不汗更服。依前法。又不汗。後服小促其間。半日許令三服盡。若病重。一日一夜

服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出。乃服至二三劑。禁生冷粘滑肉麵五辛。酒酪臭惡等物。

和劑滲濕湯 治寒濕所傷。身體重着。如坐水中。

小便赤澀。大便澹泄。

蒼朮

炒

白朮

炒

甘草

炙各一兩

茯苓

去皮

乾薑

炮各二兩

橘紅

丁香

各二錢半

每服四錢。水一盞。棗一枚。薑三片。煎七分。食前去滓溫服。

胃苓湯 治濕鬱小便不利。胸腹脹悶。或四肢沉重。或飲食停中。或濕鬱發黃。或傷食泄瀉。并一切山嵐瘴氣。侵乘而成癰痢者。皆効。

蒼朮

炒

厚朴

薑汁炒

陳皮

白朮

茯苓

各一錢半

澤瀉

猪苓

各一錢

甘草

六分

官桂

五分

積木湯治不  
氣成痞易老  
毀而為丸治  
積物成積一  
消湯丸

右水加生薑煎服

仲景小青龍湯

見十六

紫古枳木丸

治痞積消食強胃

海藏云。本仲景  
枳木湯也。今易

老改為丸。治老弱虛弱。飲  
食不化。或藏府軟弱者。

枳實

去穢。一兩。

白木

二兩

右為末。荷葉裹燒飯為丸。如桐子大。每服五十

丸。白木湯下。服白木者。本意不取其食速化。但

久服令人胃氣強實。不復傷也。

丹溪保和丸 治食積酒積。

山查肉

二兩

半夏

薑製

橘紅

神麴

麥芽

炒

白茯苓

各一兩

連翹

萊菔子

炒

黃連

各半兩

右爲末。滴水爲丸。加白朮

二兩

名大安丸。

藿香正氣散 治外感風寒。內停飲食。頭痛寒熱。

或感濕暑。霍亂泄瀉。脾轉筋。或作瘡疾。常服除。

山嵐瘴氣。

桔梗

大腹皮

紫蘇葉

茯苓

厚朴

製各一錢

甘草

炙五分

藿香

一錢五分

白芷

白朮

陳皮

去白

半夏

各一錢半

右薑棗水煎熟服。加香薷扁豆黃連名薑香湯。

枳實理中丸 治寒實結胸。

茯苓

人參

白朮

乾薑

甘草

各一兩

枳實

十六片

右爲細末。煉蜜丸如雞子黃大。每服一丸。熱湯化下。連進二三服。